

IMPFUNGEN	Säuglinge			Kleinkinder			Kinder			Jugendliche		Erwachsene						
	1,5 Mo.	2 Mo.	3 Mo.	4 Mo.	5 – 10 Mo.	11 Mo.*1	12 Mo.	13 – 14 Mo.	15 Mo.	16 – 23 Mo.	2 – 4 J.	5 – 6 J.	7 – 8 J.	9 – 14 J.	15 – 16 J.	17 J.	ab 18 J.	ab 60 J.
Tetanus, Diphtherie ^{*2}		G1	N	G2	N	G3		N				A1	N	A2	N		A (alle 10 Jahre)	
Pertussis ^{*2}		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N				A1		A2			A (einmalig)	
Poliomyelitis ^{*2}			N		N			N				N		A1	N			
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) ^{*2}			N		N			N										
Hepatitis B ^{*2}		Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung	N	Sechsfach-Impfung		N				N						
Pneumokokken ^{*3}		G1	N	G2	N	G3		N										S (einmalig)
Rotaviren ^{*4}	G1	G2	(G3)															
Meningokokken (Serotyp C)							G		N									
Masern, Mumps, Röteln (MMR) ^{*5}						G1		N	G2									S
Varizellen (V)																		
Influenza																		S (jährlich)
HPV (Humane Papillomaviren) ^{*6}														G1 + G2	N			
Herpes zoster ^{*7}																		S

U Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

T Schluckimpfung

L Lebendimpfung
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

G Grundimmunisierung bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3

S Standardimpfung

A Auffrischimpfung

N Nachholimpfung
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

*1 Aufteilung auf mehrere Impftermine möglich.

*2 Sechsfach-Impfung: Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insg. also 4 Impfdosen für die Grundimmunisierung).

*3 Pneumokokken: Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insg. also 4 Impfdosen für die Grundimmunisierung). Für die Grundimmunisierung (Kinder) wird der Konjugatimpfstoff, für die Standardimpfung (ab 60 Jahren) der 23-valente Polysaccharidimpfstoff angewendet.

*4 Rotavirus-Schluckimpfung: 1. Impfung ab dem Alter von 6 Wochen; je nach Impfstoff mit 2 Impfdosen (Rotarix®) bzw. 3 Impfdosen (RotaTeq®) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen.

*5 MMR: Grundimmunisierung: 1. MMR-Impfung mit zeitgleicher Varizellen-Impfung (an anderer Körperstelle) empfohlen, 2. MMR-Impfung mit MMRV-Kombinationsimpfstoff möglich. Standardimpfung Erwachsener: Einmalige MMR-Impfung nach 1970 geborener Erwachsener mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Impfung.

*6 HPV: Im Alter von 9–14 Jahren 2 Impfungen im Abstand von mind. 5 Monaten. Bei einem Impfabstand <5 Monate oder Beginn der Impfserie im Alter von >14 Jahren ist eine 3. Impfdosis notwendig. Unvollständige HPV-Grundimmunisierungen sollten möglichst auch bei Personen ≥18 Jahre komplettiert werden.

*7 Herpes zoster: 2 Impfungen mit Totimpfstoff im Abstand von 2–6 Monaten.